


Highlights vom EADV 2026



Science Snippet

Auswahl an Publikationen zur Psoriasis und Hidradenitis Suppurativa (HS)

Disclaimer

Dieses Material wird Ihnen von Novartis Pharma GmbH, Nürnberg ausschließlich zu Ihrer eigenen Information zur Verfügung gestellt.

Bitte beachten Sie, dass die Inhalte der wissenschaftlichen Information dienen und keine Werbezwecke verfolgen. Die beigelegten Materialien/Dokumente sind urheberrechtlich geschützt. Im Rahmen einer vertraglich vereinbarten Referententätigkeit für Novartis dürfen die Informationen unverändert übernommen werden. Ansonsten dienen die Materialien als reine Informationsgrundlage für Ihre wissenschaftliche Tätigkeit.


Im Falle einer vertraglich vereinbarten Referententätigkeit für Novartis:

Novartis Pharma GmbH, Nürnberg unterstützt das Referat, ist jedoch nicht für den Inhalt verantwortlich. Thema und Inhalt des Referats obliegen der wissenschaftlichen Freiheit des Referenten/der Referentin.


Stand der Information: Oktober 2026

ANIMA-Interimsanalyse: Wichtigste Ergebnisse auf einen Blick^{1,2}

Patient*innen mit mittelschwerer bis schwerer HS unter Secukinumab Therapie · 12-Monats-Daten




Ansprechen nach 12 Monaten (%)¹



Intervallanpassung im 1. Behandlungsjahr²

N = 267




N Gesamtzahl der Patient*innen der Interimsanalyse (Full Analysis Set). Berücksichtigt sind nur Dosisänderungen zwischen Therapiebeginn und dem jeweiligen Zeitpunkt (0, 3, 6, 9, 12 Monate). *Dosiserhöhung: Eskalation von q4w auf q2w; ebenso der direkte Wechsel von der Aufsattdosis (q1w) auf q2w ohne vorherigen Wechsel auf q4w. **Dosisreduktion: Von q2w auf q4w nach vorheriger Dosiserhöhung; der Wechsel von der Aufsattdosis (q1w) auf q4w bzw. von der Aufsattdosis (q1w) direkt auf q2w gilt nicht als Dosisreduktion.

AN Abszesse und entzündliche Knoten. DLQI Dermatology Life Quality Index. HS Hidradenitis suppurativa. IHS4 International Hidradenitis Suppurativa Severity Scoring System. NRS Numeric Rating Scale. q1w wöchentlich. q2w alle 2 Wochen. q4w alle 4 Wochen.

1. ANIMA - Sticherling M, et al. EADV 2026, P1414; 2. ANIMA -Volz T, et al. EADV 2026, P1351.

Psoriasis: Secukinumab und kardiovaskuläre Erkrankungen¹



Systematischer Review zu Secukinumab, 46 Publikationen, >9.000 Patient*innen

Entzündungsmarker

Mehrere Studien berichteten über Reduktionen von **CRP und NLR** im Zeitverlauf; vereinzelt lagen die NLR-Werte auf dem Niveau gesunder Kontrollen auch **Marker des oxidativen Stresses** niedriger.

Gefäßfunktion

Endotheliale Funktion (FMD) verbessert
Pulswellengeschwindigkeit und **koronare Flussreserve** unverändert oder verbessert;
Intima-Media-Dicke der Karotis niedriger als zu Baseline.

Daten zur kardiovaskulären Sicherheit

23 Publikationen zur KV-Sicherheit; größte Auswertung mit > 27.700 Patientenjahren aus Studien und > 1.159.000 Patientenjahren Post-Authorization:
MACE-Inzidenz in den ausgewerteten Studien vergleichbar mit den jeweiligen Kontrollgruppen.